KANTPRAXIS DR. MED. MECHTILD THUMA, DR. MED. MARCUS THUMA, DR. MED. ELMAR GIESEKE, DR. MED. LUTZ LIEBICH- BARTHOLAIN



Fachärzte für Innere Medizin - Gastroenterologische Schwerpunktpraxis

Kurfürstendamm 42 * 10719 Berlin * Telefon: 030/88 71 44 60 * Telefax: 030/88 71 44 619

www.kantpraxis.de / service@kantpraxis.de

KOLOSKOPIE-AUFKLÄRUNG

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

zur diagnostischen Klärung Ihrer Beschwerden bzw. zur Vorsorge ist Ihnen eine Koloskopie (Dickdarmspiegelung) empfohlen worden. Die Spiegelung des Dickdarms ist eines der wichtigsten Untersuchungsverfahren, um etwaige Erkrankungen im unteren Verdauungstrakt abzuklären. Sie stellt gleichzeitig die genaueste Darmkrebsvorsorge-Untersuchung dar und ist in dieser Hinsicht anderen Methoden (Computertomographie, Kernspin) überlegen.

Die Darmspiegelung ist ein schonendes Verfahren, das mit einem Endoskop durchgeführt wird. Diese Instrumente haben nur noch einen Durchmesser von etwa 1 cm und können von außen sehr gut gesteuert und leicht in den Darm eingeführt werden, um die Innenwände des Darmes darzustellen. Im Gegensatz zu Röntgenuntersuchungen wird hier strahlungsfrei mit einer kleinen Kamera an der Spitze des Schlauchs der Darmtrakt in Farbe dargestellt. Bereits kleinste Veränderungen der Schleimhaut können fotografiert und über einen Computer dokumentiert werden. Über einen feinen Arbeitskanal können über Miniaturinstrumente Gewebeproben entnommen werden, die später unter dem Mikroskop von einem Pathologen histologisch untersucht werden. Auch Polypen können mittels einer Elektroschlinge umfasst und schmerzlos abgetragen werden.



Der Ablauf der Untersuchung:

Das Endoskop wird in den Dickdarm eingeführt und unter Sicht bis zur Mündung des Dünndarmes vorgeschoben. Dabei wird der Darm durch das Einblasen von Luft entfaltet. Hämorrhoiden werden mit beurteilt und können bei Beschwerden behandelt werden. Die Darmspiegelung kann im Einzelfall unangenehm bis schmerzhaft sein. Sie erhalten auf Wunsch vor Einführen des Endoskopes eine intravenöse Schlafspritze, die bis zum Ende der Untersuchung anhält. So werden Sie von der Untersuchung nichts bemerken und auch keine Schmerzen verspüren. Während der Untersuchung werden Ihre Atmung und Ihr Kreislauf kontinuierlich überwacht. Nach der Schlafspritze sollten Sie für 24 Stunden kein Kraftfahrzeug führen, nicht an risikoreichen Maschinen arbeiten und keine wichtigen Entscheidungen treffen. Sie sollten auch am Untersuchungstag nicht als Fahrradfahrer am Straßenverkehr teilnehmen. Am besten bringen Sie eine Begleitperson mit, die Sie nach der Untersuchung nach Hause begleitet. Sie können aber auch selbständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit einem Taxi den Heimweg antreten.

Name :	Vorname:	Geb. datum:	
Welche Komplikationen k	önnen auftreten?		
Komplikationen, z.B. D Darmwandverletzung ist Im Allgemeinen, jedoch gerinnungshemmenden Polypenabtragung Blutu blutstillenden Maßnahme Gabe einer Bluttransfu Gewebeschäden (Spritze	urchstoßungen, Blutungen in der Regel eine operative n vor allem bei erhöhter Mitteln), können nach ngen auftreten. Meist lass en zum Stillstand bringen, ir sion erforderlich sein. Inf nabszesse, Nekrosen, Nerve	risikoarmes Untersuchungsverfa oder Infektionen, selten sind. Versorgung mit stationärem Aufer Blutungsneigung (z. Bsp. durch einer diagnostischen Gewebe en sie sich noch während der U m Einzelfall kann ein stationärer Au fusionen oder Injektionen könne en- und/oder Venenentzündungen) all Druckgefühl, Blutungen und Schi	Im Falle einer nthalt notwendig. The Einnahme von entnahme oder Untersuchung mit ifenthalt oder die en selten lokale nach sich ziehen.
Einige Fragen sollten vo folgenden Fragen mit ja l		werden, bitte sprechen Sie uns a	n, wenn eine der
Sie Medikamente, die di Schlafmittel? Besteht bei Allergie, insb. gegen Me Leiden Sie an Epilepsie?	e Blutgerinnung beeinflusse Ihnen eine Bluterkrankung (edikamente oder Pflaster? Be Sind Sie Diabetiker? Spritze	t (z.B. Hepatitis, HIV-Infektion oder a en (z.B. Marcumar oder ähnliches) (z.B. Blutungsneigung oder Blutarm esteht eine Herz-, Kreislauf- oder Lu n Sie Insulin oder nehmen Sie Zuck n gebärfähigen Alter: Könnten Sie s	oder regelmäßig nut)? Besteht eine ngenerkrankung? ertabletten? Sind
Nach der Koloskopie			
Bauchschmerzen oder Kro sich außerhalb unserer Ö	eislaufprobleme auftreten, ru ffnungszeiten an den Notdie	möglich) Blut aus dem After austrufen Sie bitte sofort in der Praxis an enst der Kassenärztlichen Vereinigun nes Krankenhauses aufsuchen.	oder wenden Sie
nach bestem Wissen bear	ntwortet. Ich bin über die Me rden. Ich konnte alle offenen	nden. Die Fragen zur meiner Vorge thodik und die Risiken der Koloskop Fragen zu diesem Eingriff stellen und	ie umfassend und
Ich wünsche eine k Untersuchung.	z eine (Zutreffendes ank	reuzen) Beruhigungsspritze vor de	^r endoskopischen
medizinisch angezeigten Polypenabtragung, Gum Zustimmung.	Verfahren, die sich im	eventuellen Entnahme von Gewel Verlauf der Untersuchung ergeb rhoiden, Blutstillung) gebe ich	en können (z.B.
	ung nicht zu. Ich bin mir d kung verzögert und erschwer	darüber bewusst, dass dadurch d t werden können.	ie Diagnose und
	den im Rahmen der Gesun oloskopie schriftlich erinnert	dheitsvorsorge durch die Praxis ar t zu werden.	ı eine zukünftige

Datum und Unterschrift der Ärztin / des Arztes

Datum und Unterschrift des Patienten